



# Erica vagans

 Carrasca branca

El brezo, biércol, o *Erica vagans* L. es una especie de planta fanerógama perteneciente a la familia Ericaceae.

A carrasca branca (*Erica vagans* L.).



*Erica vagans* en flor

## Descripción

Es un arbusto perennifolio que rara vez alcanza el metro de altura; muy ramosa y de finas acículas verticiladas (4 o 5) fuertemente revolutas, que abunda en las regiones de montaña de toda Europa. Su crecimiento es mayoritariamente patente (en horizontal) en el medio natural, por lo que no suele alcanzar grandes alturas, pero sí cubrir extensiones en taludes.

Las inflorescencias son racemosas y aparecen en las partes superiores de los tallos. Sus flores son urceoladas (con los pétalos soldados y de aspecto acampanado) y de color rosado-morado, y se diferencia de otras especies de *Erica* en que tanto los estambres como el estigma sobresalen por fuera de la corola.

## Floración

A partir de junio hasta septiembre-octubre, según zona.

## Se cría

En la región eurosiberiana, aunque puede aparecer a cualquier altura es más frecuente en la montaña, a partir de 800 m, depende de la región, por ello es considerado un brezo de montaña. Como la mayoría de especies del género *Erica*, crece bien en suelos ácidos y oligotróficos.

## Taxonomía

Reino:	<u>Plantae</u>
División:	<u>Magnoliophyta</u>
Clase:	<u>Magnoliopsida</u>
Orden:	<u>Ericales</u>
Familia:	<u>Ericaceae</u>
Subfamilia:	<u>Ericoideae</u>
Tribu:	<u>Ericaceae</u>
Género:	<u>Erica</u>
Especie:	<b><i>E. vagans</i></b> <u>L.</u>



Vista de la planta.

POSICIÓN EN EL ARBORETUM:



# Hábitat

Se encuentra por toda Europa, desde España hasta Dinamarca.

En España es común en el norte del país, siendo en Cantabria y el País Vasco el brezo más común.

# Taxonomía

*Erica vagans*, fue descrita por Carlos Linneo y publicado en De Erica 10. 1770.

## Citología

Número de cromosomas de *Erica vagans* (Fam. Ericaceae) y táxones infraespecíficos:  $2n=24$

## Etimología

**Erica**: nombre genérico que deriva del griego antiguo *ereikē* (*erikē*); latínizado *erice*, *-es f.* y *erica* = "brezo" en general, tanto del género *Erica* L. como la *Calluna vulgaris* (L.) Hull, llamada brecina.

**vagans**: epíteto latino que significa "errante".

## Sinonimia

- *Erica multiflora* L. [1754, Fl. Angl. : ?] [1754]
- *Erica didyma* Stokes in With. [1787]
- *Erica decipiens* St.-Amans [1821]
- *Gypsocallis vagans* (L.) Gray [1821]
- *Erica vaga* Salisb.
- *Ericoides decipiens* (St.-Amans) Kuntze
- *Ericoides pallidopurpureum* Kuntze
- *Ericoides vagans* (L.) Kuntze
- *Gypsocallis vagans* Gray-

# Nombres vernáculos

- Castellano: amadío, bereza, berezo, berezo rojo (2), berozo (2), biercol (2), biércol (2), borozo, brecina, brezo (11), brezo azul, brezo enano, brezo negral, brezo rojo, brozo (2), bruco (4), caurioto, furce, graspo, lizarra, rugón (2), ruyón, turuégano, tuérgano, uces, ur, urce (4), urce de flor morada (2), urce griñal, urcia, urz (5), urz negral, uz. Aragonés: brécol, bruco. Bable: argaña, berezu, biriezu, cotoya, gorbieza (2), gorbiezu, gorbizu, gorbifnu, gurbieza, gurbiezo, terenu, uncia.

El número entre paréntesis indica el número de especies con el mismo nombre común.



Brezal de *E. vagans*, en Lugo, España.



Inflorescencia.



