



Leucanthemum vulgare

Margarida, Camomila

La **margarita** (*Leucanthemum vulgare*) es una flor herbácea de la familia de las asteráceas.



FOTO : TERESALALOBA

Leucanthemum vulgare



Leucanthemum vulgare

Taxonomía

<u>Reino:</u>	<u>Plantae</u>
<u>Subreino:</u>	<u>Tracheobionta</u>
<u>División:</u>	<u>Magnoliophyta</u>
<u>Clase:</u>	<u>Magnoliopsida</u>
<u>Subclase:</u>	<u>Asteridae</u>
<u>Orden:</u>	<u>Asterales</u>
<u>Familia:</u>	<u>Asteraceae</u>
<u>Subfamilia:</u>	<u>Astroideae</u>
<u>Tribu:</u>	<u>Anthemideae</u>
<u>Género:</u>	<u>Leucanthemum</u>
<u>Especie:</u>	<u>Leucanthemum vulgare</u> <u>LAM.</u>

Caracteres

Vivaz con tallos normalmente simples de hasta 1 m. Hojas basales ovadas a acucharadas, de pecíolo largo, dentadas; hojas caulinares oblongas, enteras o lobuladas, las superiores sentadas, semiabrazadoras. Capítulos generalmente de 2,5-6 cm de diámetro y solitarias, con flores liguladas blancas extendidas y flores tubulosas amarillas. Brácteas involucrales con margen escariosos marrón o negro. Especie muy variable. Florece en primavera y verano.

Hábitat

Praderas, junto a caminos.

Distribución

Toda Europa. Casual en Islandia. También en la Patagonia.

Taxonomía

Leucanthemum vulgare fue descrita por Jean-Baptiste Lamarck y publicado en *Flore Françoise* 2: 137. 1778[1779].

Citológía

Número de cromosomas de *Leucanthemum vulgare* (Fam. Compositae) y táxones infraespecíficos: $2n=18$

Variedades



- *Leucanthemum vulgare* var *cantabricum* Font Quer & Guinea
- *Leucanthemum vulgare* subsp. *catalaunicum* (Vogt) O.Bolòs & Vigo
- *Leucanthemum vulgare* subsp. *eliasii*(Sennen & Pau) Sennen & Pau
- *Leucanthemum vulgare* subsp. *parviceps* (Briq. & Cavill.) Vogt & Greuter
- *Leucanthemum vulgare* subsp. *puiulae* Sennen

Sinonimia

- *Bellis major* Garsault
- *Chamaemelum leucanthemum* (L.) E.H.L.Krause
- *Chrysanthemum dentatum* Gilib.
- *Chrysanthemum ircutianum* Turcz.
- *Chrysanthemum lanceolatum* Vest
- *Chrysanthemum lanceolatum* Pers.
- *Chrysanthemum leucanthemum* L.
- *Chrysanthemum montanum* Willd.
- *Chrysanthemum montanum* var *heterophyllum* (Willd.) Koch
- *Chrysanthemum praecox* (M.Bieb.) DC.
- *Chrysanthemum pratense* Salisb.
- *Chrysanthemum sylvestre* Willd.
- *Chrysanthemum vulgare* (Lam.) Gaterau
- *Chrysanthemum vulgare* var *vulgare*
- *Leucanthemum atratum* var *heterophyllum* (Willd.) Rouy
- *Leucanthemum lanceolatum* DC.
- *Leucanthemum leucanthemum* (L.) Rydb.
- *Leucanthemum praecox* (Horvatić) Villard
- *Leucanthemum vulgare* subsp. *heterophyllum* (Willd.) Soó
- *Leucanthemum vulgare* subsp. *incisum* Arcang.
- *Leucanthemum vulgare* var *pinnatifidum* (Lecoq & Lamotte) Moldenke
- *Leucanthemum vulgare* subsp. *praecox* Horvatić
- *Leucanthemum vulgare* var *vulgare*
- *Leucanthemum vulgare* subsp. *vulgare*
- *Matricaria leucanthemum* (L.) Scop.
- *Matricaria leucanthemum* (L.) Desr.
- *Pontia heterophylla* (Willd.) Bubani
- *Pontia vulgaris* Bubani
- *Pyrethrum leucanthemum* (L.) Franch.
- *Tanacetum leucanthemum* (L.) Sch.Bip.



Ilustración



Flor

Nombre común

Castellano: belide portuguesa, consuelda media, cortadillos, crisantemo (2), floreta grande, gamarzoneh, gamarzones, mançanilla, margarita (5), margarita mayor (11), margaritón (4), pajitos (5), pichilines. (El número entre paréntesis indica las especies que tienen el mismo nombre en España)



Proposta P.M. Barreto

