



Buddleja davidii

 Arbore das volvoretas

Buddleja davidii, llamada popularmente **arbusto de las mariposas**, es una especie perteneciente a la familia de las escrofulariáceas. Originaria del noroeste de China y Japón, su uso se ha extendido como planta ornamental por los jardines de todo el mundo.



FOTO : JESUS MORADO. FLORA GALLEGA.COM

Descripción

Arbusto caducifolio o semiperennifolio que alcanza unos 2-3 m de altura. Hojas lanceoladas, de color grisáceo. Inflorescencia en espigas al extremo de las ramas, con flores de color lila, azul, púrpura, rosa, rojo-violeta, blanca etc. Entre verano y otoño, sus ramas arqueadas portan en sus extremos conos largos y estrechos de flores densamente apiñadas. Las flores atraen a las mariposas, que se alimentan de su fragante néctar.

Cultivo

Requiere suelos ligeros, bien drenados, aunque aguanta los calizos. Clima templado, resistiendo el frío sin dificultad. Exposición soleada. Se debe podar anualmente en invierno, para que se produzcan nuevos brotes que florecerán en sus extremos. Se reproduce por esquejes, en invernadero de multiplicación.

Especie invasora

Buddleja davidii se ha naturalizado en Australia y en la mayor parte de ciudades del centro y sur de Europa, donde se extiende con facilidad por baldíos y jardines. Puede ser invasora en muchas regiones, incluyendo la Islas Británicas y Nueva Zelanda. Además, en los EE. UU, se ha naturalizado a partir de escapes de cultivos, y ha sido clasificada como planta dañina en los estados de Oregón y Washington.

Buddleja davidii



Taxonomía

Reino:	<u>Plantae</u>
División:	<u>Magnoliophyta</u>
Clase:	<u>Magnoliopsida</u>
Subclase:	<u>Asteridae</u>
Orden:	<u>Lamiales</u>
Familia:	<u>Scrophulariaceae</u>
Tribu:	<u>Buddlejeae</u>
Género:	<u>Buddleja</u>
Especie:	<i>Buddleja davidii</i> <u>FRANCH.</u>



Inflorescencia.



En España

Debido a su potencial colonizador y constituir una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, esta especie ha sido incluida en el Catálogo Español de Especies exóticas Invasoras, aprobado por Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, estando prohibida en su introducción en el medio natural, posesión, transporte, tráfico y comercio.

Taxonomía

Buddleja davidii fue descrita por Adrien René Franchet y publicado en *Nouvelles archives du muséum d'histoire naturelle*, sér. 2, 10: 65. 1887.

Etimología

Buddleja: nombre genérico otorgado en honor de Adam Buddle, botánico y rector en Essex, Inglaterra.

davidii: epíteto otorgado en honor de Armand David, un misionero naturalista francés que la descubrió en 1869.

Sinonimia:

- *Buddleja shaanxiensis* Z.Y.Zhang
- *Buddleja shimidzuana* Nakai
- *Buddleja striata* Z.Y. Zhang
- *Buddleja striata* Z.Y. Zhang ex Govaerts
- *Buddleja striata* var. *zhouquensis* Z.Y. Zhang
- *Buddleja variabilis* Hemsl.
- *Buddleja variabilis* var. *magnifica* E.H.Wilson
- *Buddleja variabilis* var. *nanhoensis* Chitt.
- *Buddleja variabilis* var. *prostrata* C.K.Schneid.
- *Buddleja variabilis* var. *superba* Veitch
- *Buddleja variabilis* var. *veitchiana* Veitch
- *Buddleja variabilis* var. *wilsonii* E.H.Wilson



Vista de la planta.



Mariposa alimentándose sobre una variedad blanca.



FOTO : JESUS MORADO. FLORA GALLEGA.COM



FOTO : JESUS MORADO. FLORA GALLEGA.COM



FOTO : JESUS MORADO. FLORA GALLEGA.COM