



Cunninghamia lanceolata

Cunninghamia lanceolata, la **cunninghamia** o **abeto de la Cochinchina**, es una especie de conífera en la familia de las Taxodiaceae. También se le conoce como Araucaria de China. El **varietal 'Glauca'**, presente en el Arboretum tiene paniculas azuladas y tendencia a emitir ramas jóvenes en el pie dando lugar a árboles multitronco.



Descripción

Árbol originario del centro y sur de China, en su estado natural. Tiene una gran capacidad para rebrotar de cepa, la madera es de regular calidad.

Es de hábito monopodial, posee copa piramidal, angosta, conserva sus ramas inferiores, que se extienden horizontalmente. Su tronco es recto. su altura oscila entre los 10 y los 25 m. Sus hojas son simples, dispuestas en espiral o en dos planos más o menos divergentes, lineares lanceoladas, falcadas (2,5 -7 cm x 0,4-0,7 cm), haz verde brillante, envés claro, con anchas bandas estomáticas blanquecinas separadas por la nervadura media, margen finamente aserrado. Es un Árbol de follaje perenne.

Sus frutos son conos (estróbilos) ovoide globosos, de 3 a 5 cm de largo, terminales, formados por numerosas escamas triangulares, agudas e imbricadas y subleñosas dentadas.

Esta especie de árbol no es hermafrodita, por lo tanto se puede diferenciar el sexo de cada uno según sus conos.

Condiciones de Cultivo

Soporta clima cálido y lluvioso, con precipitaciones uniformes. Soporta algo el frío. prefiere suelos livianos, profundos, pero también crece en los pobres, siempre que estén bien provistos de humedad.

Cunninghamia



Abeto chino con poco follaje.

Taxonomía

| | |
|-----------|--|
| Reino: | Plantae |
| División: | Pinophyta |
| Clase: | Pinopsida |
| Orden: | Coniferales |
| Familia: | Taxodiaceae |
| Género: | <i>Cunninghamia</i> |
| Especie: | <i>C. lanceolata</i> (LAMB.) HOOK. |



Vista del árbol

POSICIÓN EN EL ARBORETUM:

HORREO VELLO detrás



Propiedades

Tiene una madera duramen castaño amarillento, de textura fina y homogénea, grano derecho, veteado suave, sin olor, blanda, liviana, estable, fácil de trabajar y poco durable en contacto con el suelo.

Durante los Primeros años su crecimiento es lento, luego se acelera.

Taxonomía

Cunninghamia lanceolata fue descrita por (Lamb.) Hook. y publicado en *Botanical Magazine* 54: , pl. 2743. 1827.

sinonimia

- *Abies batavorum* Siebold ex Carrière
- *Abies lanceolata* (Lamb.) Poir.
- *Belis jaculifolia* Salisb.
- *Belis lanceolata* (Lamb.) Hoffmanns.
- *Cunninghamia jaculifolia* (Salisb.) Druce
- *Cunninghamia sinensis* R.Br.
- *Cunninghamia sinensis* var. *prolifera* Lemée & H.Lév.
- *Cunninghamia unicanaliculata* D.Y.Wang & H.L.Liu
- *Cunninghamia unicanaliculata* var. *pyramidalis* D.Y.Wang & H.L.Liu
- *Larix chinensis* Mill.
- *Pinus abies* Lour.
- *Pinus lanceolata* Lamb.
- *Raxopitys cunninghamii* J. Nelson



Conos de sexo masculino de *C. lanceolata*.



Cono de sexo femenino de *C. lanceolata*.



